

FICHA TÉCNICA

ALFALFA VERDOR

Dormancia 8



- . ALFALFA CICLO ARAGÓN
- . DORMANCIA 8
- . ALTA RELACIÓN HOJA/TALLO
- . INOCULADA CON RHIZOBIUM

 **BARENBRUG**

ALFALFA VERDOR

Dormancia 8



**Semilla recubierta con
Yellow Jacket**

Inoculada con Rhizobium

Se seleccionó con plantas de alfalfa mejor adaptadas a España

VERDOR se registró en España en 2002 y sigue sobresaliendo en la actualidad



VARIEDAD	1998	Orden	1999	Orden	2000	Orden	2001	Orden	Suma
T1	17,3	6	20,5	3	24,4	1	20,0	1	82,2
VERDOR	19,8	1	21,0	2	18,8	5	14,5	4	74,1
T2	18,1	4	21,4	1	21,6	2	11,6	6	72,7
T3	19,3	2	20,0	4	18,6	6	13,2	5	71,1
T4	17,9	5	17,1	6	19,1	4	15,1	3	69,2
TA5	15,3	7	17,0	7	19,2	3	16,2	2	67,7
T6	18,6	3	19,2	5	18,6	7	11,3	7	67,7
	18,2		19,5		20,0		14,6		72,3
DMS	2,6		2,2		8,2		3,2		10,7
Cvi	9,7		8,0		8,0		14,8		11,3

Ensayos oficiales IRTA en Gimanelles 1998-2001 (T) Testigo del mercado (TA5) Aragón

¿PORQUÉ VERDOR?

- Gran uniformidad varietal
- Alta relación hoja/tallo
- Buena persistencia en el tiempo
- Buen aguante de hoja al segar
- Buena resistencia a Verticillium y Nemátodos

Se hicieron ensayos comparativos con Aragón, San Isidro y Altiva en la región de Aragón con IRTA en Lleida (1998-2001).

La variedad VERDOR fue propuesta para el catálogo oficial español. Verdor fue comparada con los testigos oficiales y finalmente inscrita en 2002.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adaptación en la Península
- Alta producción en regadíos
- Alto porcentaje de hojas
- Crecimiento erecto
- Buena densidad de plantas
- Alta persistencia

RECOMENDACIONES DE USO

- Profundidad de siembra: 0,5-1 cm
- Fecha de siembra: agosto a octubre o en primavera de marzo a abril
- Uso principal: Siega 5-6 cortes anuales
- Duración máxima: 4-5 años

PRODUCCIÓN	otoño	invierno	primavera	verano
MS ANUAL	PB 22-24 %		16 -20 tn/ha	

DOSIS DE SIEMBRA

35-40 kg/ha

PRESENTACIÓN

Saco de 10 y 25 kgs

+ INFORMACIÓN



973 212 520

nutricor@nutricor.es

nutricor.es

Sección Agricultura

Departamento técnico

iclemente@nutricor.es



Los datos de calidades y producción han sido obtenidos en nuestros campos I+D en condiciones óptimas de cultivo y abonado.